

Batateira

Estratégia de proteção



	Antes da plantação	Abrolhamento	Emergência	Crescimento	Formação do tubérculo	Floração	Tubérculo em crescimento	Amarelecimento tubérculos maduros	Armazenamento
Infestantes	Starpendi (4 L/ha)	Fusilade Max (2 L/ha) novo					Requat (3.3 - 5 L/ha)		
Alternariose		Disco (0,5-0,8 L/ha) Nufozebe 75 DG (210 g/ha)							
Míldio		Hidrotec (270 g/ha) Nufozebe 75 DG (210 g/ha) Nando 500 SC (30 - 40 ml/ha) Calda Bordalesa Caffaro 20 (200-350 g/ha)							
Afídeos		Stadio M (250 g/ha)							
Escaravelho		Deca (50 ml/ha) Carnadine (200 ml/ha) novo							
Traça da Batata		Kaiso Sorbie (40 g/ha) Bulldock (50ml/ha) novo Carnadine (100-150 ml/ha)					Deca (30 ml/ha)		
Grelamento							Bulldock (30 ml/ha) novo		Neo-stop (1 Kg/ton)
Adubações Foliares		Siapton (300 - 500 ml/ha) Frutifol L12 (200 - 800 ml/ha)							
		Prev-mag (250 - 500 ml/ha)							
							Frostgard (5 L/ha)		
Nematodocida e Desinfetante do Solo	Vapo Solo 510 (300 L/ha)								
Condicionador de Solos	Transformer (10 L/ha)								

● Herbicidas
 ● Fungicidas
 ● Inseticidas e acaricidas
 ● Diversos